



- | | | |
|--|--------------------------------|--|
| | A - Horizont | Syrosem und schwach entwick. Tschernosem |
| | (B) - Horizont | Verbraunungszone (Genese nicht näher bekannt) |
| | A - Horizont | Varietät I } carbonathaltiger und typischer Tschernosem |
| | A - Horizont | |
| | A _(ca) - Horizont | Varietät II } Tschernosem |
| | A - Horizont | degradiertes Tschernosem |
| | A - Horizont | Braunerde - Tschernosem |
| | A/(B) - Horizont | Tschernosem - Braunerde |
| | A - Horizont | (Tschernosem) - Braunerde |
| | B _v - Horizont | Braunerde (Oberboden bei Paläoböden meist abgetragen) |
| | A ₁ - (E-) Horizont | Braunerde - Lessivé (Parabraunerde) |
| | B _t - Horizont | |
| | B _v - Horizont | Braunlehm - Braunerde |
| | B _t - Horizont | Braunlehm - Braunerde - Lessivé |
| | B _v - Horizont | erdiger Braunlehm |
| | B _{v(t)} - Horizont | erdiger Braunlehm - (Lessivé) |
| | | Boden im oberen Teil abgetragen z.T. mit hangendem Löß vermischt |
| | | umgelagerter Parabraunerde - Pseudogley ("Staublehm"?) |
| | | Krotowinen |
| | C _{ca} - Horizont | Kalkkonkretionen (Lößkindel) |
| | | Oberboden sehr stark sekundär aufgekalkt (u.a. Kalkzapfen, Bielogaska) |

- | | |
|--|--|
| | typischer Löß |
| | sandiger Löß (-lössiger Sand) |
| | (Flug) Sand |
| | kolluvialer Löß |
| | "Infusionslöß", molluskenreich |
| | schluffig-toniges Sediment (z.T. sandig, z.T. mit Punktinkonkretionen) |
| | kolluvialer (geschichteter) Sandlöß |
| | geschichteter Sand |
| | sandiger Kies |
| | umgelagertes Löß- und Bodensediment (z.T. Fließerde) |

- | | |
|--|--|
| | Probenentnahmestellen für mikromorphologische Untersuchungen |
| | Grenze der jungpleistozänen gegen die mittel- und altpleistozänen Löss |
| | Jungtertiär aufgeschlossen |
| | rechte Donauseite |
| | linke |
| | Teil des Profils nicht aufgeschlossen bzw. durch Hangschutt verdeckt |
| | Höhenangaben über NN, wenn außerhalb des Vertikalmaßstabes |

Abb.1 Lößprofile im Donaauraum zwischen Wien und Belgrad